




Stratégie de traitement

- Dès le retrait des hausses



Traiter contre le varroa


= Etape très précoce de la préparation de l'hivernage

- Décontaminer avant la naissance des abeilles d'hiver
- Permettre de retirer la lanière avant le début de l'hiver



Stratégie de traitement


- L'automne, période optimale de traitement





Lanière à base d'Amitraz

Amitraz – un acaricide reconnu:




- Antiparasitaire - acaricide, famille formamidine.
- Effet sur le système nerveux central des insectes (stimulation excessive des synapses octopaminergiques)
 - Troubles de la motilité (incapacité à se fixer , tremblements et convulsions)
 - Paralysie, chute du varroa puis mort du varroa par manque d'alimentation
 - De plus, peut provoquer une anorexie chez les acariens et empêcher leur reproduction
- Actif sur les formes larvaires et adultes des acariens
- Sensible à dégradation par hydrolyse -- > très favorable pour garantir absence résidus et éviter la sélection de résistances
- Agit par contact -- > contacts des abeilles sur les lanières puis dissémination de la molécule dans la ruche par les abeilles



Mode d'action

TRAITEMENT DE CONTACT à diffusion prolongée



APIVAR : la bonne dose, au bon moment, au bon endroit

Àpivar Bonnes pratiques de traitement


Mise en place
du traitement

Vérification


Fin du
traitement

6 à 8 semaines de traitement

- 2 lanières
- Profondément, au cœur du couvain
- Dans toutes les colonies
- Garder les emballages
- Noter la date de mise en place sur l'emballage (et donc la date de retrait prévue)



- Vérifier la position de la lanière



- Retirer toutes les lanières
- Les conserver dans l'emballage d'origine, noter votre nom

